

Roche

Ajans fotoğrafı. Model fotoğraf çekimidir. © Fancy/Veer/Corbis/Getty Images

**VABYSMO® hakkında
en çok merak edilenler**

Değerli Hasta,

Bu broşürde, VABYSMO® tedaviniz ile ilgili önemli soruları sizin için cevaplandırdık. Hastalığınız ve tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen tedavinizi yürüten ekibe de başvurun.



İçerik

- 06 Etki Őekli hakkında sorular
- 08 Tedavi hakkında sorular
- 12 Enjeksiyon hakkında sorular
- 14 Destek alma imkânları hakkında sorular

Etki şekli hakkında sorular

VABYSMO® nasıl etki eder?

VABYSMO®'nun içindeki etken madde (Faricimab), yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (YBMD) ve diyabetik maküler ödemin (DMÖ) oluşumunda ve ilerlemesinde başlıca etmen olan göz içindeki şu iki sinyal iletim yolunun bloke edilmesini sağlar: vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) ve anjiyopoetin-2 (Ang-2). Etken madde, bu sinyal iletim yollarını bloke ederek, sıvı sızıntısını ve hastalıklı damar oluşumunu azaltır.

YBMD ve DMÖ hastalıklarında VEGF ve Ang-2'nin rolleri nedir?

YBMD ve DMÖ'de VEGF ve Ang-2 iletim yolları, hastalıklı damarlarının oluşumuna ve/veya gözdeki sağlıklı damarların zarar görmesine katkı sağlarlar. Bunun sonucunda da retina bölgesinde -retinada şişmeye veya retinanın hasar görmesine neden olabilecek- kan ve sıvı sızıntısı oluşabilir. VABYSMO®, VEGF ve Ang-2 yolağını bloke edebilir ve hastalıklı damar oluşumunu önleyebilir. Etkin madde görme düzeyini koruyabilir, hatta bazı durumlarda artırabilir.

Tedavi hakkında sorular

VABYSMO® bana hastalığın (YBMD/DMÖ) hangi aşamasında enjekte edilir?

Uzun süreli bir tedavi olan VABYSMO® tedavisine, ıslak tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) veya diyabetik maküler ödem (DMÖ) teşhisinin konmasından itibaren istediğiniz anda başlayabilirsiniz. Tedavinin ilk dört ayında genellikle ayda bir enjeksiyon uygulanır. Ardından enjeksiyon aralığı duruma bağlı olarak 16 haftada bir olacak şekilde uzatılabilir. Bu amaçla doktorunuz sizi periyodik kontrol muayenelerine tabi tutup, durumunuza uygun enjeksiyon sıklığını belirleyecektir.

VABYSMO® tedavisi ile hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir mi?

İlaç, YBMD veya DMÖ hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir ve böylece görme düzeyinizin korunmasını hatta iyileşmesini sağlayabilir.

Tedavi ne kadar sürer?

VABYSMO[®], uzun süreli bir tedavi uygulamasıdır. Doktorunuz, tedaviden istenen sonucun alınıp alınmadığını görmek için, gözünüzün durumunu düzenli olarak kontrol edecektir.

Kontrol muayeneleri göz doktorum tarafından yapılabilir mi? Ayrı bir uzmana mı gitmem gerekir?

Kontrol muayenelerinin kendi doktorunuz tarafından mı farklı bir muayenehanede mi yapılacağını öğrenmek için doktorunuza başvurun.

Kaç tane kontrol randevum olacak?

Enjeksiyonlar arasındaki kontrol muayenelerinin sıklığı, kişisel durumunuza ve doktorunuzun takdirine göre belirlenir. Her ay kontrol muayenesi yapılması gerekmemektedir.

Düzenli kullandığım başka ilaçlar olması durumunda dikkat etmem gereken noktalar var mı? İlaçların birbiriyle etkileşimi olabilir mi?

Başka ilaçlar kullanıyorsanız/uyguluyorsanız, daha önce kullandıysanız/uyguladıysanız veya kullanmayı/uygulamayı planlıyorsanız doktorunuzu bu durumdan haberdar edin.

VABYSMO® ile tedavi görürken hamile kalmamda veya emzirmemde bir sakınca var mı?

VABYSMO® tedaviniz devam ederken hamile kalmamalı ve emzirmemelisiniz. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, bu durumu doktorunuza bildirin.

Hamile kalabilir yaştaki kadınlar VABYSMO® ile tedavi gördükleri sürece ve tedavi sonrasında en az üç ay boyunca güvenilir bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. VABYSMO® tedaviniz sırasında hamile kalmanız veya hamile olduğunuzdan şüphelenmeniz durumunda bunu derhal doktorunuza bildirin.

Enjeksiyon normalde hangi sıklıkla yapılır? DMÖ'de? YBMD'de?

Tedavinin başlangıç aşamasında genellikle dört ay boyunca size ayda bir kez enjeksiyon uygulanır. Ardından enjeksiyon aralığı duruma bağlı olarak 16 haftada bir olacak şekilde uzatılabilir. Bu amaçla doktorunuz sizi periyodik kontrol muayenelerine tabi tutup, durumunuza uygun enjeksiyon sıklığını belirleyecektir.

VABYSMO® gözün hangi noktasına enjekte edilir?

İlaç, ince bir kanül yardımıyla doğrudan gözün vitröz jeline enjekte edilir. Böylece etken maddenin tam da etki göstermesi istenen noktaya ulaşması sağlanır. Ağrı vermemesi veya ağrının en aza indirilmesi için, enjeksiyon göze lokal anestezi altında uygulanır.

Enjeksiyon, kendi göz doktorum tarafından uygulanabilir mi, uzman bir muayenehaneye gitmem mi gerekir?

VABYSMO®, göz enjeksiyonlarının uygulanması alanında deneyimli doktorlar tarafından enjekte edilir. Gerekirse, enjeksiyonlar için doktorunuz sizi bu konuda uzman bir muayenehaneye yönlendirecektir.

Bir enjeksiyon kaçırdığımda ne yapmalıyım?

Enjeksiyon randevunuzu kaçırdığınız durumda hiç vakit kaybetmeden doktorunuz ile yeni bir randevu oluşturun.

Destek alma imkânları hakkında sorular

Örneğin sosyo-hukuki sorular gibi farklı konularda destek almak için nereye başvurabilirim?

Hastalıkla yaşamak ve günlük hayata ilişkin sorularınıza yönelik cevaplar ve destek için kendi kendine destek gruplarına ve hasta organizasyonlarına başvurabilirsiniz.

Daha fazla detay ve iletişim bilgileri için, **www.meineaugenblicke.de** adresli web sitemizin **Gut beraten** bölümüne göz atın.

Lütfen web sitesinin içeriğinin şu anda yalnızca Almanca olarak mevcut olduğunu unutmayın. YBMD veya DMÖ tedavisi hakkında daha fazla bilgiyi **www.meineaugenblicke.de** adresindeki **“Tedavim”** giriş alanında bulabilirsiniz.

Aynı durumda olanlarla nasıl bilgi alışverişinde bulunabilirim?

Kendi kendine yardım temelli destek gruplarına katılarak, retina hastalığı olan diğer insanlarla deneyim ve bilgi alışverişinde bulunabilir ve kendinize bir network oluşturabilir, yani bağlantılar kurabilirsiniz. Lokal gruplar, yaşadığınız yerde yüz yüze iletişim ve destek imkânı sunar. Çoğu zaman hasta yakınları için de danışmanlık hizmetleri veya destek grupları mevcuttur. Çünkü deneyimlerin paylaşılması onlar için de yararlı olabilir.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Böylece ilacın güvenliğine ilişkin yeni bilgilerin hızlı bir şekilde belirlenmesi sağlanır. Görülen her türlü yan etkiyi bildirerek, bu sürece katkı sağlayabilirsiniz. Görülen yan etkileri lütfen grenzach.drug_safety@roche.com adresinden veya +49 7624/14-3183 numaralı fakstan Roche Pharma AG'ye ya da www.pei.de adresinden veya +49 6103/77-1234 numaralı fakstan Paul-Ehrlich-Institut'a bildirin.

Roche Pharma AG
Patient Partnership Ophthalmologie
Emil-Barell-Straße 1
79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

www.roche.de

© 2023